

Kako je prepoznati?

Možete li nam pomoći?

BUDI TE OPREZNI!

Lespedeza cuneata je drvenasto-zeljasta višegodišnja biljka i raste u visinu od 0,5-1 m. Biljka proizvodi tropere listove duž cijelog stabla. Stabljike mogu biti grube ili fine u zavisnosti od kultivara. Liske su duge, uske i na kraju uvučene; jedna od ključnih osobina koja se koristi za razlikovanje *L. cuneata* od *L. juncea*.



Slika: Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org

Zato što *Lespedeza cuneata* ima potencijal da utiče na staništa koja napada, uključujući autohtone biljne vrste i važne funkcije ekosistema, važno je sva zapažanja prijaviti organima za zaštitu bilja. Rano otkrivanje će omogućiti brzu primjenu odgovarajućih mjera protiv *Lespedeza cuneata*.

Ako vidite *Lespedeza cuneata*:

- Provjerite identifikaciju vrste sa drugim vrstama mahunarki.
- Kad god je moguće, napravite fotografiju biljke, zabilježite tačnu lokaciju, datum i stanište na kojem je bila uočena.
- Kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja
Odjeljenje za analizu rizika

Tel: +38733290710; +38751259698

mail: infoprava@uzzb.gov.ba

Inspektorati entiteta i Brčko distrikta BiH/najbliži
fitosanitarni inspektor

uprava@inspektorat.vladars.net; info@fuzip.gov.ba;

fitosanitarnabrcko@gmail.com;



Ovaj letak je pripremljen u okviru LIFE projekta LIFE15 PRE FR 001 u saradnji sa NERC Centrom za ekologiju i hidrologiju.

Lespedeza cuneata
Prijetnja za EPPO region



5453296

Slika: Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Odjeljenje za analizu rizika

Tel: 0038733290710; 0038751259698

mail: infoprava@uzzb.gov.ba

www.uzzb.gov.ba



Pripremljeno u saradnji sa EPPO –
www.eppo.int

Šta je *L. cuneata*?

Lespedeza cuneata je uspravna ili poluspravna višegodišnja leguminoza porijeklom iz Azije.

Lespedeza cuneata se smatra prijetnjom autohtonom biodiverzitetu, i u slučaju njenog pojavljivanja u novim područjima potrebno je da se odmah prijavi organima za zaštitu bilja.



Slika: Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org

Šta je problem?

Lespedeza cuneata može uspijevati u različitim uslovima, potiskujući autohtone vrste u prirodnim područjima. Ova vrsta formira guste sklopove u oblastima u kojima se pojavi, smanjujući pristup svjetlosti i potencijalno povećavajući konkurenciju za vodu u zemljištu. Invazije u hrastovim savanama u jugoistočnom Kansasu (SAD), smanjile su bogatstvo autohtonih biljnih vrsta i smanjile brojnost beskičmenjaka. *L. cuneata* također može imati uticaj na prirodne zajednice putem alelopatskih efekata. Utvrđeno je da alelopatske hemikalije smanjuju performanse domaćih biljnih vrsta za 60%.



Slika: Chuck Barger, University of Georgia, Bugwood.org

Gdje se nalazi?

Ova biljna vrsta trenutno nije prisutna u prirodnom okruženju u EPPO regionu.

U okviru svog invazivnog raspona, ova vrsta naseljava staništa kao što su : travnjaci, šumski proplanci, šume, obodi bara, pašnjaci i degradirana staništa. Vrsta može uspijevati na malom broju staništa koja su pogodna za hortikulturu u EPPO regionu. Ova vrsta se koristi kao kabasto hranivo izvan EPPO regiona i može u budućnosti biti unesena u region za ove namjene u potrazi za novim biljkama bogatim proteinima.



Slika: Dan Tenaglia, Missouriplants.com, Bugwood.org